

lie de 莉婕
Blauné

頂級涵養髮膜染髮霜

- ★ 使用前請務必詳細讀完本使用說明書且正確使用。
- ★ 染髮偶爾會發生嚴重過敏反應。
- ★ 請務必於每次染髮前進行皮膚過敏反應測試。

使用注意事項

1. 有下列情況者請勿使用：

- 過去曾因染髮劑（包含其他產品）而過敏者。
- 曾經於染髮中或染髮後有蕁麻疹（搔癢、起疹子、發紅）或感到不適者（呼吸不順暢、頭暈等）。
- 皮膚過敏反應測試結果，肌膚有異常者。
- 頭皮或皮膚處於敏感狀態者（生病時、病後恢復期、生理期、懷孕等）。
- 頭部、臉部、頸部有紅腫、傷口、皮膚病者。
- 有腎臟病、血液疾病病史者。
- 持續身體不適者（輕微發燒、疲倦、心跳加速、呼吸困難、紫斑、容易出血、經血不易停止等）。

2. 使用前的注意事項：

- 請務必於每次染髮之前兩天（48小時前）依右側指示進行皮膚過敏反應測試。皮膚過敏反應測試是確認體質是否對染髮劑會產生過敏反應。針對塗抹部位進行兩次觀察，第一次是塗抹後30分鐘，第二次是塗抹後48小時。即使過去從未過敏，也有可能因為體質改變而導致過敏，因此請務必每次都進行皮膚過敏反應測試。
- 請勿使用於頭髮以外的地方。此為用於頭髮之產品。
- 請勿染眉毛、睫毛，以避免染劑流入眼中。
- 剛剃除臉上汗毛時請勿使用本產品。肌膚上可能有細微傷口，容易受到刺激。
- 染髮前後一星期內請勿燙髮，以免髮質受損、掉色情況發生。

3. 使用時的注意事項：

- 請於染髮時才混合染劑，並馬上使用。
- 請於通風良好處染髮。
- 請務必戴上內附的染髮手套。
- 請勿於染髮時沐浴或於染髮前沾濕頭髮，以避免流汗或染劑流入眼中。
- 染髮時請避免染劑沾染到臉部、頸部等。不慎沾到時，請馬上用水沖洗。
- 請注意勿讓染劑或沖洗染劑時的水流入眼中，以避免眼睛產生劇烈疼痛、甚至眼睛受傷（眼角膜發炎等）。不慎流入時，**絕對不要揉眼睛**，請馬上以冷水或溫水充分沖洗15分鐘以上，並立即至眼科診所就診。
- 染髮中皮膚出現疹子、搔癢、紅腫、強烈刺激等皮膚異常現象，或出現蕁麻疹、呼吸不順暢、頭暈等症狀時，請立即用清水將染劑沖洗乾淨，並馬上就診。
- 染髮後感到有任何異常，請務必就診。

4. 保管上的注意事項

- 請放置於嬰幼兒無法拿取處，以避免誤食而造成危險。
- 請避免放置於高溫或陽光直射的地方。

*本產品不適用於16歲以下者使用。

★請注意，染劑沾染到衣服、地板、地毯、牆壁等將無法清洗。

注意！

過去曾因染髮而過敏者、皮膚過敏反應測試結果有異常者請絕對不要使用。

關於皮膚過敏反應測試出現異常、皮膚狀態及商品諮詢等，請撥打消費者諮詢專線：0800-061-668（平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00）周六、周日及國定節假日，請利用 www.kao.com/tw/contact_us.html 與我們聯絡。


皮膚過敏反應測試程序

皮膚過敏反應測試是為了確認體質是否會對染髮劑產生過敏反應。即使過去從未過敏，也有可能因為體質變化而導致過敏，因此**請務必於每次染髮前48小時**進行皮膚過敏反應測試。


STEP1：請準備下列物品




STEP2：製作皮膚過敏反應測試用之混合劑



STEP3：塗抹於手背內側，靜置 48 小時



STEP4：觀察塗抹部位兩次



STEP5：48 小時後，確認無異常發生才可染髮

關於皮膚過敏反應測試出現異常、皮膚狀態及商品諮詢等，請撥打消費者諮詢專線。

使用步驟

一盒染髮劑為短髮者（肩膀以上長度）全髮染一次用量。

2 將混合劑均勻塗抹於頭髮上

* 使用染髮梳來梳髮時，請小心避免傷害頭皮。

● 請牢固組裝好3合1染髮梳。




● 將第1劑與第2劑分別擠出相同的劑量於混合盤中。




● 使用3合1染髮梳充分攪拌混合兩劑。




● 藏上手套。綁上橡皮筋以防滑落。



● 使用齒梳端將全部頭髮均勻塗抹



● 如圖中所示，用3合1染髮梳的尖端，由髮根開始將頭髮分層，並用刷毛端將混合劑塗抹於頭髮上。



● *兩劑混合均勻後請立即使用。

混合後若放置超過60分鐘則會失去上色效果。
★ 第1劑最後剩餘的染劑可能會變成黑色～咖啡色，第二次使用時，第1劑瓶口也有可能變成黑色。以上兩種變色情形均不會影響染髮效果。

★ 使用後，請將第1劑（綠蓋）及第2劑（白蓋）的蓋子確實旋緊。
* 經過一段時間後，顏色就難以去除。
* 頭髮粗硬等不易染色者，建議多放置5~10分鐘。
* 染後髮色會因染前髮色、髮質、白髮量等因素而有所差異。

每次使用前請務必進行皮膚過敏反應測試。
請務必詳讀「使用前的準備」。

即使第二次使用本產品，每次使用前請務必進行皮膚過敏反應測試。

要點

* 要點為先從髮根開始塗抹染髮霜。若從之前曾染過的頭髮先塗抹，顏色可能會變得更深。

● 局部染髮的使用方法（補染新長出的白髮）

1 使用刷毛端將混合劑充分塗抹於新生頭髮處。

* 將較多量混合劑塗抹於新生頭髮的髮根。

2 靜置約10分鐘。

* 頭髮粗硬等不易染色者，建議多放置5~10分鐘。

3 使用齒梳端將全部頭髮均勻塗抹

為使頭髮整體色調均勻，請使用齒梳端將髮根的混合劑均勻梳向髮尾。

4 靜置約5分鐘。

● 對於白髮明顯的區域補染方法

- 針對白髮明顯的區域，使用刷毛端塗抹較多量混合劑。
- 使用齒梳端將全部頭髮均勻塗抹。
- 靜置約15分鐘。

詳細步驟請參照「整頭染的使用方法」和「局部染髮的使用方法」。

3 仔細沖洗後再進行洗髮與護髮

- 靜置時間結束後，用清水徹底沖淨頭髮。
- 請仔細沖洗，比平常更用心地洗髮兩次。

- 請注意沖洗時不要讓染劑流入眼中。
- 亦可使用潤絲精或護髮乳護理頭髮。

★ 請將頭髮徹底吹乾。

★ 請注意下列情況可能會讓衣服、帽子、枕頭套等沾染到染髮劑：

- 頭髮是濕的狀態時（大量流汗、淋雨、游泳、洗髮後、使用美髮用品後等）
- 大量使用生髮劑、整髮劑、慕絲等美髮用品後。

為下次染髮做準備

* 軟管中剩餘的染髮霜，請確實旋緊蓋子後存放，留待下次使用。

* 僅使用一次很難染出較淺的髮色，染髮顏色會隨著染髮次數增加而變淺。

* 為避免損傷頭髮，建議染髮頻度為一個月一次。補染多次後可能會有髮色不均的現象，建議每三個月進行一次整頭染髮。

已混合但未用完的混合劑會失去染髮效果。請務必將剩餘的混合劑沖洗丟棄。

注意